

SCHMERZMITTEL, THROMBOZYTENAGGREGATIONSHEMMER MIT ACETYLSALICYLSÄURE (ASS)

- Acesal Tabletten
- Herbin Stodin Tabletten
- Aggrenox® Retardkapseln
- Herz ASS Tabletten
- Alacetan Schmerztabletten
- Malinert Tabletten
- Alka-Seltzer Brausetabletten
- Melabon® K Tabletten
- Antineuralgie Tabletten
- Melabon® plus C Brausetabletten
- Apernyl
- Miniasal Tabletten
- Apovital Tabletten
- Neuralgin Schmerztabletten
- Aspirin® Tabletten & Brausetabletten
- Neuraidal Schmerztabletten
- Aspro Tabletten und Brausetabletten
- Ortoton Plus Tabletten
- ASS Tabletten
- Precineural
- ASS+C Hexal® Brausetabletten
- Quadronal Tabletten
- Ausbuettels 500 Tabletten
- Ratiogrippel + C Brausetabletten
- Boxazin Brausetabletten
- ratiophyrin Schmerztabletten
- Cc Forte Tabletten
- Ring N Tabletten
- Cebion® Brausetabletten
- Recidolor Tabletten
- Chephapyrin® N Tabletten
- Retortapyrin Tabletten
- Coffetylin® Tabletten
- Santasal N Tabletten
- dolomo®
- Spalt® Schmerztabletten
- Dolviran Tabletten
- Stodinal Tabletten
- Doppel-Spalt compact Tbletten
- Temagin Tabletten
- Dorocoff Tabletten
- Thomapyrin® C Brausetabletten
- Eudorlin® Schmerztablette
- Thomapyrin® Schmerztabletten
- Fibrex Tabletten
- Titralgan® Schmerztabletten
- Fineural N Tabletten
- Togal® Classic Tabletten
- Godamed Tabletten
- Togal® C Brausetabletten
- HA-Tabletten N®
- Werodon Tabletten

>> **Bitte erst nach Rücksprache mit dem Hausarzt und Operateur 5 Tage vor dem OP-Termin absetzen**

ANTIDIABETIKA MIT DEM WIRKSTOFF METFORMIN

- Aranka Filmtabletten
- Biocos
- Bonformin
- Diabesin
- Diabetase
- Espa Formin
- Glucobon
- Glucophage
- Juformin
- Metformin
- Metfogamma
- Siofor
- Mediabet
- Meglucon
- Mescorit
- Met
- Metform
- Thiabet

>> **2 Tage (48 Stunden) vor dem OP-Termin absetzen.**

ANDERE THROMBOZYTENAGGREGATIONSHEMMER WIE Z.B.

- Asasantin Kapseln
 - Iscover Filmtabletten
 - Tiklyd Filmtabletten
 - Desitic Iopidin Filmtabletten
 - Plavix Filmtabletten
 - Ticlopidin Filmtabletten
 - Integrilin, Aggrastat, ReoPro
 - Infusionslösungskonzentrat
- Falls Sie Psychopharmaka einnehmen wenden sie sich bitte im Vorfeld der Operation an unsere Anästhesieabteilung

>> **Bitte erst nach Rücksprache mit dem Hausarzt und Operateur 5 Tage vor dem OP-Termin absetzen**

PROSTATAMITTEL MIT DEM INHALTSSTOFF ALFUZOSIN

- Urion-Tabletten
- UroXatral-Tabletten

>> **24 Stunden vor dem OP-Termin absetzen**