




Chefarzt PD Dr. Rolf Schauer



Oberarzt Dr. Peter Kanngießer

Proktologisch werden Sie von **Dr. med. Peter Kanngießer** von der Diagnostik bis zur Therapie und Nachsorge betreut. Er erhielt seine proktologische Qualifikation an den wichtigsten koloproktologischen Instituten Europas (St. Mark's Hospital, London, Prosper Hospital, Recklinghausen). Dr. Kanngießer ist Chirurg und Proktologe und als Oberarzt in der Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie am Klinikum Traunstein (Chefarzt PD Dr. med. R. Schauer) tätig.



Abt. für Allgemein-, Viszeral- u.  
Thoraxchirurgie



**Klinikum Traunstein**

# Proktologie

**Information  
für  
Ärzte  
und  
Patienten**



## Kontaktadresse und wichtige Telefon- Nummern:

### Anschrift:



**Klinikum Traunstein**  
Proktologie  
Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie  
Priv. -Doz. Dr. med. Rolf J. Schauer  
Cuno-Niggli-Strasse 3  
**83278 Traunstein**

**Telefon:** +49 (0)861-705 1201 (Sekretariat)  
**Fax:** +49 (0)861-705 1470  
**E-Mail:** proktologie@klinikum-traunstein.de  
**Internet:** www.klinikum-traunstein.de

## Sprechstunden für alle proktologischen Krankheitsbilder:

Dienstag von 08:00 - 10.00 Uhr  
Anmeldung telefonisch über Sekretariat 0861-705-1201

## Telefon-Nummern der Stationen:

- Station 5/1 (Privatstation): 0861-705-1331
- Station 2/3 (Allgemein): 0861-705-1576
- Station 2/4 (Interdisziplinär): 0861-705-1397





## Liebe Patientinnen und Patienten, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Nahezu jeder zweite Erwachsene entwickelt im Laufe seines Lebens Beschwerden im Enddarmbereich. Die Ursachen hierfür sind vielfältig und die Beschwerden häufig uncharakteristisch. Hinweise für das Vorhandensein einer Erkrankung im Analbereich sind z.B. lästiges Nässen (feuchter After), Jucken und Wundsein im Analbereich sowie Brennen beim Stuhlgang. Weiterhin können Schmerzen und Blutungen, Druck im Dammbereich sowie das Gefühl unvollständiger Stuhlentleerung oder ein permanenter Stuhldrang sowie unwillkürlicher Stuhlverlust konkrete Hinweise auf das Vorliegen einer proktologischen Erkrankung sein.

Die hochkomplexe Anatomie und Physiologie des Endarms erfordert eine spezialisierte Erfahrung bei den in diesem Bereich auftretenden Krankheitsbildern, um hier durch eine zielführende Diagnostik zu einer korrekten Einschätzung des Krankheitsbildes und einer optimalen Therapiewahl zu gelangen. Im neu gegründeten **Schwerpunkt Proktologie** innerhalb der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie können sämtliche Erkrankungen im proktologischen Bereich auf höchstem Niveau versorgt werden. Dabei wird besonderer Wert auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Gastroenterologie (Chefarzt Dr. A. Kreuzmayr) sowie der Diagnostischen Radiologie (Chefarzt Dr. W. Weiß) gelegt.

Diese Broschüre soll Ihnen einen Überblick über unser Behandlungsspektrum im Bereich Proktologie geben und Ihnen Informationen zur schnellen Kontaktaufnahme mit unserer Abteilung ermöglichen.

Im **Schwerpunkt Proktologie** der Abteilung Allgemein- und Viszeralchirurgie werden folgende Erkrankungen behandelt:

- Analabszess
- Analfistel
- Analfissur
- Analthrombose
- Analcondylome (Analwarzen)
- Bösartige Erkrankungen im Analbereich
- Chronische Obstipation (Stuhlverstopfung)
- Hämorrhoiden
- Marisken (Hautfalten am After)
- Rektumprolaps (Darmvorfall)
- Stuhlinkontinenz

## Angebotene therapeutische Verfahren

### Hämorrhoiden:

- Stapler-Verfahren nach Longo, eine besonders schmerzarme, minimalinvasive Methode. Ein wesentlicher Vorteil gegenüber den herkömmlichen Operations-Verfahren ist hierbei die Schonung der sensiblen Afterhaut



III-gradige Hämorrhoiden bei einer 70-jährigen Patientin. Blutungen und Jucken waren die Hauptbeschwerden.



Nach 20 Minuten Operation in Allgemeinnarkose stellt sich das Anoderm wieder normal dar.

- Sämtliche weitere Verfahren zur Hämorrhoiden-Operation
- Plastische Rekonstruktion bei Hämorrhoidenvorfall
- HAL-Methode (Hämorrhoiden-Arterien-Ligatur)

### Analfisteln:

- Spaltung bei einfachen Fistelerkrankungen
- Operative Therapie analer Crohn-Fisteln
- Plastische Versorgung von rektovaginalen Fisteln (Mastdarm-Scheiden-Fisteln)
- Plastische Rekonstruktion bei Fisteln mit Schließmuskelbeteiligung (trans- und suprasphinktäre Fisteln)

### Inkontinenz:

- Operative Rekonstruktion der Schließmuskulatur

### Mastdarmvorfall:

- Transanale Resektion nach Rehn-Delorme oder nach Altemeier: Die Prinzipien dieser Operationen sind eine ausgedehnte Resektion des prolabilierenden Darms durch den After.
- STARR-Methode (stapled transanal rectal resection), ein minimal-invasives und innovatives Verfahren zur operativen Beseitigung eines Mastdarmvorfalls
- Laparoskopische (mittels Bauchspiegelung) Teilentfernung von Dickdarm und Fixierung des Mastdarmes am Kreuzbein