

Kolon- und Rektumkarzinom

Name	Einschlusskriterien	Studienfokus
Edium	Primärfälle mit KRK, elektiv operativ oder nicht- operativ palliativ	Ergebnisqualität bei Darmkrebs: Identifikation von Unterschieden und Maßnahmen zur flächendeckenden Qualitätsentwicklung, insbesondere PRO (patient-reported outcome)
LeQs	Pat. mit kolorektalem Karzinom, bei denen präoperativ eine Stomaanlage geplant ist.	Untersucht wird der Unterschied der erwarteten Lebensqualität nach Stomaanlage zu der tatsächlichen postoperativen Lebensqualität anhand von Fragebögen.
Prävalenz der Mangelernährung	Primärfälle mit KRK, elektiv operativ	Studie zur Prävalenz der Mangelernährung in der zentralisierten Versorgung von Darmkrebspatienten
Fire 4,5	Metastasierendes, BRAF-mut. Kolorektales Karzinom	Folfoxiri plus Cetuximab vs. Folfoxiri plus Bevacizumab als Erstlinientherapie
Fire 4	Metastasiertes, kolorektales Karzinom	Cetuximab Reexposition (RAS Wildtyp), bei Pat., die auf die first-line-Behandlung mit FOLFIRI+Cetuximab ein Ansprechen zeigten.
Colopredict	Kolonkarzinom Stadium UICC Stadium I-III	retro- und prospektive Erfassung der Rolle von MSI und KRAS für die Prognose beim Kolonkarzinom im Stadium I-III (Versand von Tumorproben)