

## Lymphome

Name	Studienart	Einschlusskriterien	Studienfokus
<b>FL-Register</b>	Beobachtungsstudie (Register)	Patienten mit follikulärem Lymphom, die nicht im Rahmen einer interventionellen Studie behandelt werden	Register zu Epidemiologie und Behandlungspraxis bei follikulären Lymphomen
<b>EMCL-Register</b>	Beobachtungsstudie (Register)	Patienten mit Mantelzelllymphom	Register zur Behandlungspraxis beim Mantelzelllymphom
<b>MCL Elderly III</b>	Therapiestudie Phase II	Patienten mit unbehandeltem Mantelzell-Lymphom, die für eine Hochdosistherapie nicht in Frage kommen	Venetoclax in Kombination mit Ibrutinib und Rituximab vs. Standard-Chemo mit Ibrutinib und Rituximab
<b>Arched</b>	Therapiestudie Phase III	unbehandeltes diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom, Patienten über 80 oder über 60 und nicht geeignet für volle Dosis R-CHOP	Acalabrutinib in Kombination mit Rituximab und reduzierter Dosis R-CHOP vs. reduzierte Dosis R-CHOP
<b>Olympia 3</b>	Therapiestudie Phase III	unbehandeltes diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom	O-CHOP vs. R-CHOP
<b>MMML-Predict</b>	Beobachtungsstudie (Register)	Erstdiagnose eines (D)LBCL, vor Beginn der Erstlinientherapie nach Standard (R-CHOP (-like))	Entwicklung & Validierung eines akkuraten und kostengünstigen Predictors zur frühzeitigen Identifikation von Patienten mit hohem Risiko für Nichtansprechen bzw. Therapieversagen
<b>GLA Register</b>	Beobachtungsstudie (Register)	malignes Lymphom (außer Hodgkin Lymphom, Multiples Myelom und CLL)	Register zur Dokumentation der Behandlungsrealität von malignen Lymphomen