



Kolon- und Rektumkarzinom

Name	Studienart	Einschlusskriterien	Studienfokus
Pearl	Screeningstudie (Register)	Kolorektales Karzinom - Patienten unter 50; Diagnose liegt nicht länger als 1 Jahr zurück	Risikofaktoren in der Altersgruppe unter 50; Möglichkeiten zur Vermeidung von Darmkrebs im jüngerem Erwachsenenalter
ColoPredict Plus 2.0	Beobachtungsstudie (Register)	Kolonkarzinom Stadium UICC Stadium I-III	Erfassung der Rolle von MSI und KRAS für die Prognose beim Kolonkarzinom im Stadium I-III (Versand von Tumorproben)
Protector	Therapiestudie Phase III	fortgeschrittenes Kolonkarzinom	Präoperative Therapie mit mFolfoxiri oder mFolfox-6 oder Capox vs. postoperative stadien-adaptierte Therapie
Smart Resect	Therapiestudie (Endoskopie)	nicht-vorthespiert, nicht-gestielter Laterally spreading tumor (LST) granular type homogenous oder non-granular type $\geq 20\text{mm}$ im Kolorektum	Schlingenspitzen-Soft Coagulation des Resektionsrandes vs. keine Koagulation nach großflächiger Kallschlingenresektion
ACTICCA-2	BO-Studie	inoperables perihilares oder duktales Cholangiokarzinom mit palliativer systemischer Therapie und Gallengang-Stentimplantation	Radiofrequenzablation mittels Katheter und transpapillärem Zugang bei Patienten mit Cholangiokarzinom
COMPASS	Parallelgruppen-Bestätigungsstudie	Patienten mit einem obstruktiven linksseitigen Dickdarmkrebs verringert	untersucht, ob ein dekomprimierendes Stoma als Überbrückung bis zu einer elektiven Operation die 120-Tage-Sterblichkeit im Vergleich zu einer Notresektion