



Lymphome

Name	Studienart	Einschlusskriterien	Studienfokus
FL-Register	Beobachtungsstudie (Register)	Patienten mit follikulärem Lymphom, die nicht im Rahmen einer interventionellen Studie behandelt werden	Register zu Epidemiologie und Behandlungspraxis bei follikulären Lymphomen
EMCL-Register	Beobachtungsstudie (Register)	Patienten mit Mantelzelllymphom	Register zur Behandlungspraxis beim Mantelzelllymphom
MCL Elderly III	Therapiestudie Phase II	Patienten mit unbehandeltem Mantelzell-Lymphom, die für eine Hochdosistherapie nicht in Frage kommen	Venetoclax in Kombination mit Ibrutinib und Rituximab vs. Standard-Chemo mit Ibrutinib und Rituximab
Arched	Therapiestudie Phase III	unbehandeltes diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom, Patienten über 80 oder über 60 und nicht geeignet für volle Dosis R-CHOP	Acalabrutinib in Kombination mit Rituximab und reduzierter Dosis R-CHOP vs. reduzierte Dosis R-CHOP
MMML-Predict	Beobachtungsstudie (Register)	Erstdiagnose eines (D)LBCL, vor Beginn der Erstlinientherapie nach Standard (R-CHOP (-like))	Entwicklung & Validierung eines akkuraten und kostengünstigen Predictors zur frühzeitigen Identifikation von Patienten mit hohem Risiko für Nichtansprechen bzw. Therapieversagen
GLA Register	Beobachtungsstudie (Register)	malignes Lymphom (außer Hodgkin Lymphom, Multiples Myelom und CLL)	Register zur Dokumentation der Behandlungsrealität von malignen Lymphomen